

PREVENIRANJE INFEKCIJE

Svakodnevna primjena higijenskih mjera neophodna je za sprječavanje širenja ambulantnih infekcija na životinje i ljude unutar veterinarskih ustanova, kao i njihovo širenje u okolinu.

PREPORUKE ZA HIGIJENU I KONTROLU INFEKCIJA U VETERINARSKOJ PRAKSI PREVENCIJA INFEKCIJA

OPERITE I DEZINFICIRAJTE RUCHE

Najvažniji postupak u kontroli ambulantnih infekcija u praksi.

PRANJE RUKU

- Na početku i na kraju radnog dana
- Nakon posjete toaletu
- Prije i poslije jela ili pušenja
- Kada su vidljivo uprljane
- Nakon kontakta sa životinjskim tekućinama i izlučevinama
- Prije aseptične ili invazivne procedure u kombinaciji sa dezinfekcijom

DEZINFICIRAJTE RUCHE

- (koristite antiseptike na bazi 70-90% alkohola)
- Ruke trebju biti suhe i čiste
 - Prije i nakon kontakta sa svakim pacijentom
 - Prije i nakon navlačenja rukavica
 - Prije kontakta s opremom, kvakama na vratima ili tipkovnicom na kompjuteru

Na rukama se ne smije nositi nikakav nakit (prstenje, narukvice), niti ručni sat, a nokti moraju biti kratko odrezani i čisti (tekst u sivo plavom- dolje lijevo).



NOŠENJE ZAŠTITNE ODJEĆE

Osigurajte čiste šake i podlaktice nošenjem laboratorijske uniforme s kratkim rukavima sve vrijeme dok tretirate pacijenta. Zaštitnu odjeću ne treba nositi van radnog okruženja.

DODATNA ZAŠTITNA ODJEĆA


Maske, kape, sterilni ogrtači i rukavice moraju se koristiti tijekom operativnih zahvata i invazivnih procedura.

Plastične pregače, rukavice i maske obavezno je koristiti prilikom:

- Tretiranja pacijenta u kojega je utvrđena prisutnost ili sumnja na zaraznu bolest
- Kada ste u kontaktu s potencijalno zaraženim tekućinama i izlučevinama

Promijenite dodatnu zaštitnu odjeću:

- Između tretiranja dva pacijenta
- Kada se krećete između odjela, izolacije ili odjela za intenzivnu skrb



ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA PROSTORIJA

Koristite sredstva namijenjena za dezinfekciju veterinarskih prostorija i pratite upute. Koristite rukavice. Prilikom čišćenje opreme slijedite preporuke proizvođača.

POVRŠINE I OPREMA

- Čistite i dezinficirajte prije i poslije svakog pacijenta, kao i kod vidljivog zaprljanja
- Čistite i dezinficirajte rukohvate na vratima, tipkovnice, prekidače za svjetlo i telefone na dnevnoj osnovi

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE (ULAZ, RECEPCIJA, ČEKAONICA, HODNICI)

- Čistite i dezinficirajte svaki dan, kao i kod vidljivog zaprljanja

ODJELI, IZOLACIJA (KARANTENA) I INTENZIVNA SKRB

- Čistite i dezinficirajte prije i nakon svakog pacijenta, kao i kod vidljivog zaprljanja



OBUKA OSOBLJA

Obuka osoblja i njegovo upoznavanje sa načinom i ciljem provođenja higijenskih mjera osnova su dobre prakse. Ispravnu higijenu nije teško provoditi kada svi razumiju njenu važnost.

Razvijte protokol za higijenu i istaknite ga u pisanom obliku na vidljivo mjesto. Odredite odgovornog člana osoblja za provođenje protokola.

Omogućite kontinuiranu edukaciju osoblja iz područja higijene.



UPORABA RUKAVICA

- U kontaktu sa oboljelim životinjom ili onom za koju postoji sumnja da boluje od neke zarazne bolesti, uključujući parazite i gljivična oboljenja.
- Kada tretirate bilo kakve rane
- Kada postoji mogućnost dolaska u kontakt sa krvlju, tjelesnim tekućinama, izlučevinama, i sluznicama
- Tijekom operativnog zahvata ili kada je neophodna asepsa (sterilne rukavice)
- Koristite nove rukavice nakon tretiranja svakog pacijenta ili kada su vidljivo kontaminirane
- Promijenite rukavice prije dodirivanja opreme, rukohvata ili tipkovnice

Nošenje rukavica ne zamjenjuje održavanje higijene ruku



KIRURŠKA PRIPREMA

- Operacijska sala se koristi samo za kirurške zahvate
- Ošišajte (nemojte brijati) operacijsko polje prije samog kirurškog zahvata u posebnoj prostoriji. Usisajte ošišanu dlaku. Očistite i dezinficirajte škare između dva pacijenta
- Pripremite kožu nakon šišanja: operite ju antibakterijskim sapunom s vodom, a potom očistite alkoholom i klorheksidinom
- Kirurg mora oprati ruke antibakterijskim sapunom ili blagim sapunom nakon čega će ruke dezinficirati prema protokolu prakse
- Tijekom operacije obavezno je korištenje zaštitne odjeće. Zaštitna odjeća koja se nosi u operacionoj sali ne smije se koristiti u drugim prostorijama ambulante
- Koristite samo sterilizirane instrumente, po mogućnosti u autoklavu. Hladna sterilizacija je dozvoljena samo u izuzetnim slučajevima
- Spriječite životinju da ne liže, grebe ili na neki drugi način traumatizira mjesto kirurškog reza



PRANJE ODJEĆE I OSTALIH TEKSTILNIH MATERIJALA

- Operacijske i laboratorijske kute peru se dnevno, a po potrebi i u trenutku vidljivog zaprljanja tj. kontaminacije
- Plahte i dekice za životinje peru se između svakog pacijenta i kada su vidljivo zaprljane ili kontaminirane
- Pranje treba obavljati ili u klinici ili u servisu za pranje odjeće
- Odstranite svaku vidljivu zaprljanost ili kontaminaciju prije pranja (koristite rukavice)
- Perite na 60 C i sušite na visokoj temperaturi kako biste uništili infektivne organizme
- Držite jasno odvojenim prljavi i čisti dio u prostoriji za pranje kako biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju
- Čuvajte čiste plahte i odjeću u posebnoj dijelu namijenjenom za tu svrhu



EDUKACIJA VLASNIKA KUĆNIH LJUBIMACA

Koristite tiskane materijale (letke, postere) i razgovarajte o higijeni s vlasnicima kućnih ljubimaca.

- Kako bi se osigurala dobra praksa higijene tijekom posjete klinici, kao i u kontaktu sa ljubimcima u njihovom domu
- Kako bi se podržali napor veterinarara za poboljšanjem higijene i odgovornog korištenja antimikrobnih lijekova skupa s propisanom terapijom.
- Kako bi se javnost bolje upoznala sa zdravstvenim implikacijama uzročnika antimikrobnih otpornih infekcija u kućnih ljubimaca

